

بررسی ریز ریخت‌شناسی تعدادی از گونه‌های یک‌ساله سردۀ علف هفت‌بند در ایران

مریم کشاورزی^{*}، اکرم غلامی و زهرا ناظم‌بکایی

دریافت: ۱۳۹۴/۹/۶ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ چاپ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

^{*}مسئول مکاتبات: m.keshavarzi@alzahra.ac.ir

چکیده. سردۀ علف هفت‌بند با ۲۹ گونه در ایران گروهی از گیاهان یک‌ساله و چند ساله را در زیستگاه‌های مختلف تشکیل می‌دهد. *P. aviculare* تشکیل گونه‌ای پیچیده را داده که تفکیک آن از گونه‌های *P. patulum*، *P. arenastrum* بسیار دشوار است. در این تحقیق تلاش شده است تا با بررسی‌های دانه‌های گرده، سطح فندقه‌ها، بشره پوشاننده گلپوش و برگ، صفات افتراقی برای گونه‌ها فراهم آید. در مجموع ۳۳ جمعیت از ۶ گونه یک‌ساله علف هفت‌بند مشتمل بر *P. arenastrum*، *P. patulum*، *P. argyrocoleon*، *P. polycnemoides* و *P. olivascens* بررسی شدند. واحدهای جمعیتی از طبیعت جمع‌آوری و با میکروسکوپ نوری و الکترونی شدند. بررسی دانه‌های گرده در تمام گونه‌های تحت بررسی از نوع منفرد، subprolate یا Prolate spheroidal و سه‌شیری هستند. بیشترین تنوع در تزئینات سطحی مشاهده شد. طول محور استوایی، طول محور قطبی، طول شیار، قطر نسبی گرانول‌ها و متوسط فاصله گرانول‌ها سایر صفات افتراقی دانه‌های گرده بودند. بررسی آماری داده‌های بشره مؤید آن است که طول و عرض یاخته‌های بشره و نیز طول یاخته روزنه در گونه‌های بررسی شده تنوع نشان می‌دهند. ارتباطی نزدیک بین *P. arenastrum* و *P. aviculare* و بین گونه‌های *P. argyrocoleon* و *P. olivascens* دیده شد. موقعیتی متمایز برای گونه *P. polycnemoides* می‌تواند با ویژگی‌های بشره مشخص شود. نتایج مشخص کرد که مجموعه صفات انتخابی دارای ارزش تاکسونومیکی است.

واژه‌های کلیدی. دانه گرده، بشره، تیره علف هفت‌بندیان، میوه

Micromorphological study of some annual *Polygonum* L. (Polygonaceae) in Iran

Maryam Keshavarzi*, Akram Gholami & Zahra Nazem Bokaei

Received 27.11.2015/ Accepted 05.03.2016/ Published 18.03.2017

Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

*Correspondent author: m.keshavarzi@alzahra.ac.ir

Abstract. With 29 species in Iran, *Polygonum* L. is comprised of annual and perennial plants in different habitats. *P. aviculare* makes a species complex, hardly distinguished from *P. arenastrum* and *P. patulum*. In the present study, pollen grains, fruit surface and petals and leaves epidermis features were used to provide diagnostic features in order to separate species from one another. In Total, 33 populations of 6 annual species, including *P. aviculare*, *P. arenastrum*, *P. patulum*, *P. argyrocoleon*, *P. polycnemoides* and *P. olivascens* were studied. Specimens were gathered during field trips and studied by means of light and scanning electron microscopes. The Pollen grains of all the species which were studied were monad, subprolate or prolate spheroidal and tricolpate. Main differences were also observed in their surface ornamentations. Length of equatorial and polar axes and colpus, granules diameters and the average distance between granules were other diagnostic features of the pollen grains. Statistical analysis of epidermis features revealed that the length and width of epidermis cells and stomata length varied in the species studied. A close relationship was found between *P. aviculare* and *P. arenastrum* on the one hand and *P. argyrocoleon* and *P. olivascens* on the other. The separation of *P. polycnemoides* could be attributed to differences in epidermis features. Results showed that a selected set of these features to be of taxonomic importance.

Keywords. polygonaceae, epidermis, pollen, fruit

مقدمه

گونه در هفت بخش گزارش شده است (Rechinger & Schiman-Czeika, 1968). سردۀ علف هفت‌بند یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های سیستماتیک را در تیره علف هفت‌بندیان داراست. گونه‌های متنوع در فلورهای مختلف با صفات بخش‌های رویشی و زایشی از هم تفکیک می‌شوند. هرچند سرده‌های مجزایی امروزه از سرده بزرگ *Polygonum* L. بیرون کشیده

Polygonum L. در مفهوم باریک شامل گیاهان یک‌ساله یا پایا، به‌ندرت چوبی با ساقه کم‌ویش برگ‌دار و غالباً نازک و ظریف است. این تاکسون در ایران دارای ۲۹ گونه است که تقریباً در تمام ایران انتشار دارند (Mozaffarian, 2012). علف هفت‌بند در جهان با ۴۲۰ گونه پراکنده است. در فلورا ایرانیکا ۵۲

در گونه‌های یک‌سالهٔ علف هفت‌بند (Keshavarzi et al., 2012) و ساختمان تشریحی ساقه (Nazanin Bokaei et al., 2015) در گونه‌های یک‌ساله ارزش تفکیکی این صفات را مشخص کردند. ریز ریخت‌شناسی و ویژگی‌های دانه‌های گرده، سطح میوه و بشره در قبیله‌های علف هفت‌بندیان ارزش تشخیصی این صفات را در تفکیک تعدادی از سرده‌ها و گونه‌ها در این تیره مشخص کردند (Mosaferi & Keshavarzi, 2011).

با توجه به دشواری‌های تفکیک برخی گونه‌های یک‌سالهٔ علف هفت‌بند، در این تحقیق به بررسی تنوع ریزریخت‌شناسی تعدادی از این گونه‌ها در ایران پرداخته می‌شود تا بتوان صفات متمایز بهتری برای تفکیک گونه‌ها از یکدیگر فراهم آورد.

مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری از نواحی مختلف ایران در محدودهٔ پراکنش گونه‌های یک‌سالهٔ سرده *Polygonum* مشتمل بر *P. argyrocoleon* Steud. ex *arenastrum* Boreau *P.*، *P. Patulum* M. Bieb. *P. aviculare* L. Kunze *P.* و *olivascens* Rech. f. & Schiman-Czeika *P.* *polycnemoides* Jaub. & Spach صورت گرفت. نمونه‌برداری در بهار و تابستان سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مناطقی از ۱۲ استان ایران انجام شد (جدول ۱). مجموعهٔ نمونه‌های هر باربومی جمع‌آوری شده در هر باربوم دانشگاه الزهراء (ALUH) موجود است. نمونه‌ها با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی موجود بررسی و شناسایی شدند (Post, 1932; Coode & Cullen, 1967; Rechinger & Schiman-Czeika, 1968; Bobrov et al., 1970; Qaiser, 2001; Anjen et al., 2003; Freeman & Reveal, 2005). زیرگونه‌های *P. aviculare* بر اساس مقاله Mosaferi و همکاران (2015) شناسایی شد. از هر جمعیت حداقل پنج فرد حداکثر ده فرد تحت بررسی قرار گرفت. مطالعات ریزریخت‌شناسی دربارهٔ ۳۳ جمعیت از ۶ گونهٔ یک‌ساله *Polygonum* انجام گرفت. به منظور انجام تحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات کیفی به صورت دوحالته یا چندحالتی کدگذاری شدند و برای صفات کمی از میانگین اندازه‌گیری‌ها در جمعیت‌ها استفاده شد. سپس، با استفاده از نرم‌افزار SPSS بررسی‌های آماری مقدماتی صفات کمی و کیفی و سپس تحلیل‌های آماری چندمتغیره انجام گرفت.

شده‌اند، در هر حال صفاتی مانند وضعیت ساقه، شکل برگ، جور یا ناجور برگی، یک ساله یا چندساله بودن، میزان کرک بخش‌های رویشی، رنگ آکرا، جنس، بافت و ابعاد آن در جدایی گونه‌های این سرده تأثیرگذارند (Rechinger & Schiman-Czeika, 1968). صفات بخش‌های زایشی در تفکیک بسیاری از گونه‌ها در این سرده اهمیت ویژه دارند؛ برای مثال، نسبت بخش پیوستهٔ جام به بخش آزاد آن، رنگ جام، رنگ بساک، هم‌اندازه بودن میلهٔ پرچم‌ها، جنس و رنگ فندقه در تفکیک گونه‌ها مؤثرند. نوع آرایش سلول‌های اپیدرمی، ضخامت دیواره‌های بیرونی، نوع کرک و ساختمان تشریحی رگبرگ مرکزی در برگ می‌تواند در تفکیک بخش‌های مختلف درون سرده *Polygonum* کارآمد باشد. Decraene و Akeroyd (1988) با بررسی حدود سرده *Polygonum* بر اساس صفات گل به بررسی بشرهٔ پوشانندهٔ گلبرگ پرداختند و تفاوت‌هایی را از نظر تشریحی بین الگوی بشرهٔ اعضای دو قبیلهٔ *Persicariae* و *Polygonaceae* معرفی کردند. Hong و همکاران (2000) با مطالعات میکروسکوپ الکترونی سطح گلپوش، برخی تفاوت‌های مهم را بین سرده‌های دو قبیلهٔ *Polygonaceae* و *Persicariae* را آشکار کردند. Ayodele و Olowokudejo (2006) با بررسی صفات اپیدرم برگ در گونه‌های مختلف *Polygonum* دریافتند که تیپ روزنهٔ پاراسیتیک نوع اساسی و عام روزنه در گونه‌های مختلف *Polygonum* در مفهوم وسیع است. در ایران، از بررسی‌های انجام‌شده می‌توان به تحقیقات Nadernezhad و همکاران (2004) اشاره کرد که با مجموعه‌ای از صفات ریخت‌شناسی زایشی و رویشی سه گونه از این سرده را در استان کرمان از یکدیگر تفکیک کردند. آنها همچنین در این بررسی گونه‌های دیگری را که امروزه متعلق به سرده *Persicaria* (L.) Mill. است از *Polygonum s. str.* جدا کردند. به اعتقاد ایشان، در تفکیک گونه‌های سرده *Polygonum* ابعاد گیاه، شکل برگ و اکرا حائز اهمیت است. Amiri و Sharifnia (2007) چند گونه از بخش‌های مختلف سرده را در ایران از نظر گرده‌شناسی تحت بررسی قرار دادند. این محققان ویژگی‌های گرده‌شناسی مانند شکل عمومی دانهٔ گرده، وضعیت شیار و تزئینات سطحی را در جدایی بخش‌ها مؤثر دانستند. بررسی‌های ساختمان تشریحی برگ

جدول ۱- مشخصات واحدهای جمعیتی تحت بررسی *Polygonum*
Table 1. Accession details of *Polygonum* specimens studied.

| نام تاکسون | محل جمع آوری و شماره هرباریومی |
|-----------------------------|---|
| <i>Polygonum arenastrum</i> | استان ایلام، ایلام، پارک جنگلی چغاسبز، رضایی نژاد ۸۶۱ |
| <i>P. arenastrum</i> | استان تهران، تهران، درکه، غلامی ۸۶۲ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان کرمانشاه، کرمانشاه، روستای گوهر چغا، غلامی ۸۶۳ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان کرمانشاه، کرمانشاه، روستای محمود آباد، غلامی ۸۶۴ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان کرمانشاه، کرمانشاه، روستای گندآباد، غلامی ۸۶۵ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان گیلان، رشت، نتاج ۸۶۶ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان همدان، همدان، غلامی ۸۶۸ |
| <i>P. argyrocoleon</i> | استان آذربایجان شرقی، خسروشهر، غلامی ۸۷۳ |
| <i>P. aviculare</i> | استان زنجان، تاکستان، غلامی ۸۷۶ |
| <i>P. aviculare</i> | استان همدان، همدان، غلامی ۸۷۹ |
| <i>P. aviculare</i> | استان لرستان، خرم آباد، دیرکوندی ۸۸۱ |
| <i>P. aviculare</i> | استان آذربایجان غربی، ارومیه، غلامی ۸۸۲ |
| <i>P. aviculare</i> | استان آذربایجان غربی، حسنلو، غلامی ۸۸۳ |
| <i>P. aviculare</i> | استان آذربایجان غربی، مهاباد، غلامی ۸۸۵ |
| <i>P. aviculare</i> | استان گیلان، رشت، نتاج ۸۹۱ |
| <i>P. aviculare</i> | استان مازندران، بابل، نتاج ۸۹۲ |
| <i>P. aviculare</i> | استان مازندران، بابلسر، غلامی ۸۹۳ |
| <i>P. aviculare</i> | استان مازندران، کلاردشت، نتاج ۸۹۵ |
| <i>P. aviculare</i> | استان تهران، ونک، دانشگاه الزهرا، غلامی ۹۰۲ |
| <i>P. olivascens</i> | استان مرکزی، ساوه، یل آباد، کشاورزی ۹۰۵ |
| <i>P. olivascens</i> | استان تهران، نسیم شهر، فلاطوری ۹۰۶ |
| <i>P. olivascens</i> | استان تهران، تهران، غلامی ۹۰۸ |
| <i>P. olivascens</i> | استان تهران، مسیل درکه، غلامی ۹۱۰ |
| <i>P. olivascens</i> | استان تهران، ونک، غلامی ۹۱۱ |
| <i>P. olivascens</i> | استان تهران، درکه، غلامی ۹۱۲ |
| <i>P. patulum</i> | استان تهران، ونک، دانشگاه الزهرا، غلامی ۹۱۴ |
| <i>P. patulum</i> | استان آذربایجان غربی، خورخور، ۸۰ کیلومتری ارومیه، غلامی ۹۱۷ |
| <i>P. patulum</i> | استان آذربایجان غربی، میاندوآب، غلامی ۹۱۸ |
| <i>P. patulum</i> | استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایوبلو، غلامی ۹۲۰ |
| <i>P. patulum</i> | استان آذربایجان غربی، گمچی، ۳۰ کیلومتری ارومیه، غلامی ۹۲۱ |
| <i>P. patulum</i> | استان گلستان، گرگان، غلامی ۹۲۳ |
| <i>P. polycnemoides</i> | استان تهران، درکه، غلامی ۹۲۴ |
| <i>P. polycnemoides</i> | استان تهران، آبعلی، غلامی ۹۲۵ |

مورفومتریک این تحقیق در جدول ۲ آمده است. برای انجام بررسی‌های گرده‌شناسی با میکروسکوپ نوری از نمونه‌های تازه- جمع‌آوری شده استفاده شد. دانه‌های گرده با میکروسکوپ دوربین دار DP12 تحت بررسی و عکس‌برداری قرار گرفتند. برای بررسی جزئیات تزئینات سطحی دانه‌های گرده نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی SEM مطالعه شدند. در این بررسی، از واژه‌شناسی Punt استفاده شد (Punt et al., 1994). برای بررسی ویژگی‌های سطح فندقه‌ها از استریومیکروسکوپ دیجیتال Dino-Lite مدل AM413T و میکروسکوپ الکترونی SEM از نوع Philips مدل XL30 استفاده شد. برای لایه‌نشانی از دستگاه

تحلیل واریانس (ANOVA) برای تعیین حدود اختلاف معنی‌دار بین جمعیت‌های گونه‌های مطالعه‌شده نسبت به یکدیگر انجام گرفت. برای اینکه مشخص شود صفاتی که تفاوت معنی‌داری دارند متعلق به کدام جمعیت‌ها هستند از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) استفاده شد. سپس برای تعیین قرابت گونه‌ها و جمعیت‌های مطالعه‌شده از روش‌های مختلف تجزیه خوشه‌ای و رسته‌بندی بر مبنای مؤلفه‌های حاصل از تحلیل تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) استفاده شد. به منظور مشخص شدن متنوع‌ترین صفات بین گونه‌ها و جمعیت‌ها از تحلیل فاکتور استفاده شد. فهرست صفات کمی و کیفی و نسبی تحت بررسی در مطالعات

تعلق دارد. همچنین، با تعیین نسبت طول محور قطبی به طول محور استوایی طبق نظر Erdtman در سال ۱۹۴۳ مشخص شد که شکل دانهٔ گرده در گونه‌های این سرده subprolate یا Prolate spheroidal است.

خصوصیات فندقه

فندقه در کلیهٔ گونه‌های تحت بررسی تخم‌مرغی و سه گوشه بوده است و صفات کیفی و کمی سطح میوه متنوع است (جدول ۶). سه گونهٔ *P. patulum*, *P. olivascens*, و *P. polycnemoides* فاقد تزئینات سطحی در فندقهٔ خود هستند. در حالی که *P. arvensis*, *P. aviculare* و *P. argyrocoleon* دارای این تزئینات هستند (شکل ۲). جمعیت‌های متعددی از *P. aviculare* بررسی شد که برخی مانند جمعیت‌های ارومیه و تاکستان به زیرگونهٔ *Polygonum aviculare* L. subsp. *buxiforme* (Small) Costea & Tardif جمعیت خرم‌آباد نیز به زیرگونهٔ *Polygonum aviculare* L. subsp. *depressum* (Meisn.) Arcang. تعلق داشت اما در هیچ‌یک از زیرگونه‌ها تفاوت در تزئینات سطحی مشاهده نشد. از نظر صفات کمی نیز نسبت طول به عرض فندقه‌ها و نیز میزان باریک‌شدگی نوک و شکل کلی فندقه در بین گونه‌های تحت بررسی تفاوت نشان می‌دهد که در شکل ۲ مشهود است.

بشرهٔ گلپوش

یاخته‌های بشره پوشانندهٔ گلپوش در گونه‌های تحت بررسی سرده *Polygonum* مستطیلی تا بیضوی با دیواره‌های سینوسی است. بررسی صفات کیفی و کمی بشرهٔ گلپوش مؤید آن است که صفات کیفی و کمی در میان گونه‌های سرده *Polygonum* - متنوع است (شکل ۳).

یاخته‌های بشرهٔ گلپوش *P. polycnemoides* با بیشترین طول و پهنا، عمیق‌ترین فرورفتگی دیواره را دارند در حالی که دیواره یاخته‌های بشرهٔ پوشانندهٔ گلپوش *P. arenastrum* و *P. aviculare* کم‌عمق‌ترین فرورفتگی‌ها را دارند. پهنای متوسط یاخته‌های *P. aviculare* کوتاه‌تر از پهنای متوسط یاخته‌های *P. arenastrum* است (جدول ۷).

بشرهٔ سطح پشتی برگ

لایه‌نشان طلا (sputter coater) ساخت BAL-TEC و مدل SCDOOS استفاده شد و ضخامت ۱۰۰ انگسترم لایه روی نمونه‌ها ایجاد شد. به منظور بررسی سطح پشتی برگ از روش زدودن بافت‌های اضافی استفاده شد. به این منظور، ابتدا برگ در آب جوشانیده شد و سپس در آب‌ژاول قرار گرفت و با سبز متیل رنگ آمیزی شد. در خصوص بشرهٔ پوشانندهٔ گلبرگ، به روش بافت‌زدایی نیازی نبوده و پس از نرم شدن گل‌ها و رنگ آمیزی با سبز متیل آمادهٔ مشاهده شدند.

نتایج


دانه‌های گرده

تنوع خصوصیات ریختی دانه‌های گرده در گونه‌های تحت بررسی مشاهده شد (شکل ۱). خلاصهٔ نتایج حاصل از بررسی دانه‌های گرده در جدول ۳ آمده است. در مطالعهٔ دانهٔ گرده صفات کمی نظیر طول محور استوایی، طول محور قطبی، طول شیار، قطر نسبی گرانول‌های اگزین، متوسط فاصله بین گرانول‌ها، تعداد شیار گرده ارزیابی آماری شدند. تحلیل فاکتور براساس ویژگی‌های گرده نشان می‌دهد که دو عامل اول در مجموع ۸۷ درصد تنوع گونه‌های تحت بررسی را سبب شده‌اند. در عامل اول، صفاتی چون طول محور استوایی، طول شیار دانهٔ گرده، فواصل گرانول‌ها و طول محور قطبی به ترتیب بیشترین تنوع را سبب شده‌اند و در عامل دوم، قطر گرانول‌ها بیشترین تنوع را سبب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان صفاتی با ارزش افتراقی بیشتری را نسبت به سایر صفات مشخص کرد (جدول ۴). طی این بررسی‌ها مشخص شد که کلیهٔ دانه‌های گرده تحت بررسی در این سرده دارای سه شیار بوده‌اند و تزئینات سطحی آنها غالباً از نوع گرانولیت است. مشاهدات حاصل از صفات کمی، که شامل طول محور استوایی، طول محور قطبی، طول شیار، قطر نسبی گرانول‌ها و متوسط فاصلهٔ گرانول‌ها از یکدیگر است، نشان‌دهندهٔ تنوع گونه‌های تحت بررسی است (جدول ۵). بیشترین مقدار طول محور قطبی و استوایی متعلق به گونه‌های *P. arenastrum*، *P. aviculare* و *P. argyrocoleon* است و کمترین مقدار آنها متعلق به گونه‌های *P. patulum* و *P. polycnemoides*

جدول ۲- صفت‌های کمی و کیفی مورد استفاده در این پژوهش.

Table 2. Qualitative and quantitative features used in the present study.

| صفت‌های کمی (μ) | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| طول محور قطبی | متوسط فاصله گرانول‌های سطح آگزین | فاصله بین گرانول‌های سطح میوه |
| طول محور استوایی | قطر متوسط گرانول‌های سطح میوه | طول شیار |
| طول روزنه | پهنای متوسط روزنه | تعداد یاخته‌های همراه |
| پهنای متوسط یاخته‌های بشره | طول متوسط یاخته‌های بشره گلپوش | |
| صفت‌های کیفی | | |
| شکل دانه گرده از منظر قطبی | رنگ فندقه | دیواره یاخته بشره سطح پشتی برگ |
| شکل دانه گرده از منظر استوایی | تزیینات سطح فندقه | دیواره یاخته بشره سطح گلپوش |
| چسبیدگی فندقه به گلپوش | تیپ روزنه | |



شکل ۱- میکروگراف دانه‌های گرده در گونه‌های تحت بررسی.

Fig. 1. Pollen micrographs of the species studied.

A-B: *P. arenastrum*, C-D: *P. olivascens*, E-F: *P. argyrocoleon*, G-H: *P. patulum*, I-J: *P. aviculare*, K-I: *P. polycnemoides*.

ایندکس روزنه از ۱۹ درصد تا ۲۹ درصد متغیر است (جدول ۷). شکل یاخته‌های روزنه‌ای گنبدی تخت است و از این نظر تفاوت فاحشی در میان جمعیت‌های این گونه دیده نشد (شکل ۴).

ساختمان بشره پشتی برگ در جمعیت‌های این گونه از نوعی یک‌نواختی برخوردار است و یاخته‌های بشره‌ای مستطیلی تا چندضلعی هستند. آرایش و تیپ روزنه از نوع آنیزوسیتیک است.

جدول ۳- نتایج حاصل از ارزیابی صفات کمی و کیفی دانه‌های گرده در گونه‌های تحت بررسی.

Table 3. Results obtained from evaluation of quantitative and qualitative features of pollen grains.

| Species | نشانی | P* | | | E* | | | P/E | Shape | طول * شمار |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|---------------|
| | | Min | Mean | Max | Min | Mean | Max | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | بابل | 21.05 | 23.90 | 26.47 | 13.57 | 20.06 | 23.43 | 1.19 | Subprolate | 17.71 |
| | تاکستان | 24.48 | 25.48 | 26.97 | 18.82 | 21.38 | 23.12 | 1.19 | Subprolate | 21.9 |
| | ارومیه | 18.81 | 22.22 | 24.23 | 16.83 | 19.85 | 23.31 | 1.11 | Prolatespheroidal | 18.6 |
| <i>P. olivascens</i> | نسیم شهر | 19.39 | 21.97 | 24.31 | 16.42 | 18.85 | 21.41 | 1.16 | Subprolate | 15.40 |
| | تهران | 18.49 | 21.31 | 25.70 | 16.36 | 18.62 | 20.50 | 1.14 | Subprolate | 19.22 |
| | ساوه | 22.11 | 23.93 | 25.62 | 19.04 | 21.91 | 24.23 | 1.09 | Prolate-spheroidal | 19 |
| | درکه | 18.39 | 21.14 | 25.78 | 15.65 | 18.16 | 21.65 | 1.16 | Subprolate | 15.5 |
| | ونک | 19.87 | 21.29 | 22.58 | 17.39 | 18.71 | 20.66 | 1.13 | Prolatespheroidal | 14.75 |
| <i>P. patulum</i> | گمچی | 17.48 | 19.99 | 22.12 | 16.70 | 18.21 | 19.63 | 1.09 | Prolatespheroidal | 16.40 |
| | میان‌دوآب | 19.53 | 21.56 | 23.29 | 16.47 | 18.01 | 19.22 | 1.19 | Subprolate | 16.23 |
| | ونک | 20.02 | 20.80 | 22.00 | 16.31 | 17.68 | 18.64 | 1.17 | Subprolate | 15.25 |
| <i>P. polycnemoides</i> | آبعلی | 18.55 | 19.74 | 21.60 | 17.16 | 17.81 | 18.64 | 1.10 | Prolatespheroidal | 16.02 |
| | درکه | 17.86 | 19.77 | 22.26 | 14.08 | 17.04 | 19.84 | 1.16 | Subprolate | 16.13 |
| <i>P. argyrocoleon</i> | گندآباد | 21.90 | 24.55 | 26.08 | 18.36 | 20.21 | 21.74 | 1.21 | Subprolate | 21.69 |
| <i>P. arenastrum</i> | ایلام | 24.17 | 25.13 | 26.47 | 17.94 | 20.49 | 24.12 | 1.22 | Subprolate | 19.20 |

*اندازه‌ها برحسب میکرون است.

*Measurements are in micrometer.

جدول ۴- مقادیر فاکتور اول، دوم حاصل از تجزیه به عامل‌ها براساس صفات کمی و کیفی دانه‌های گرده.

Table 4. Values of the first and second factors based on quantitative and qualitative pollen features.

| صفات | فاکتور ۱ | فاکتور ۲ |
|--------------------|----------|----------|
| طول محور استوایی | 0.97 | |
| طول شمار دانه گرده | 0.97 | |
| طول محور قطبی | 0.85 | |
| فواصل گرانول‌ها | 0.84 | |
| قطر گرانول‌ها | | 0.85 |

جدول ۵- خلاصه‌ای از ویژگی‌های دانه‌های گرده در گونه‌های *Polygonum* تحت بررسی.Table 5. A summary of pollen features in *Polygonum* species studied.


| نام گونه | صفات | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | <i>Polygonum polycnemoides</i> | <i>Polygonum patulum</i> | <i>Polygonum olivascens</i> | <i>Polygonum aviculare</i> | <i>Polygonum argyrocoleon</i> | <i>Polygonum arenastrum</i> | |
| شکل گرده از منظر قطبی | گرد | گرد | گرد | گرد | گرد | گرد | |
| شکل گرده از منظر استوایی | بیضی | بیضی کشیده | بیضی کشیده | بیضی | بیضی کشیده | بیضی کشیده | |
| الگوی تزئینات | Granulate - foveolate | Granulate | - granulate Fossulate | - granulate Fossulate | - granulate foveolate | Granulate | |
| قطر متوسط گرانول‌ها | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.3 | |
| فاصله متوسط گرانول‌ها | 0.68 | 0.59 | 1.03 | 0.94 | 0.63 | 1.02 | |

جدول ۶ - نتایج بررسی صفات کیفی ریخت‌شناسی سطح فندقه در برخی گونه‌های یک‌ساله *Polygonum*Table 6. Results of the study of qualitative features of achene surface in some annual *Polygonum* species.

| تاکسون | <i>P. arenastrum</i> | <i>P. argyrocoleon</i> | <i>P. aviculare</i> | <i>P. olivascens</i> | <i>P. patulum</i> | <i>P. polycnemoides</i> |
|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| جدا | چسبیده | جدا | چسبیده | جدا | جدا | جدا |
| کوتاه | وضعیت نوک فندقه | کوتاه | خیلی کوتاه | کوتاه | کوتاه | کوتاه |
| درخشان | درخشندگی فندقه | کدر | کدر | کدر | درخشان | درخشان |
| صاف | الگوی تزئینات سطح فندقه | منقوط | منقوط | منقوط | صاف | صاف |
| قهوه‌ای تیره- سیاه | رنگ فندقه | قهوه‌ای تیره | قهوه‌ای تیره | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن |
| | قطر متوسط تزئینات | 7.62 | 10.81 | 10.73-8.76 | - | - |
| | فاصله بین تزئینات | 10.23 | 16.02 | 8.84 | - | - |


جدول ۷ - خلاصه نتایج بررسی صفات کمی بشره در گونه‌های تحت بررسی *Polygonum*Table 7. A summary of quantitative features of epidermis in *Polygonum* species studied.

| تاکسون | صفات کمی | بشره گلبرگ | | بشره پستی برگ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | طول ساخته | پهنای ساخته | طول ساخته- های اپیدرمی | پهنای ساخته- های اپیدرمی | طول روزنه | روزنه آبگس |
| <i>p. arenastrum</i> | درکه | ۵۹/۰۳ | ۲۲/۶۵ | ۵۴/۳ | ۲۹ | ۲۲ | ٪۲۰ |
| | ایلام | ۴۲/۳۹ | ۱۹/۴۶ | ۵۳/۲۰ | ۲۸/۶۰ | ۲۱/۲۲ | ٪۲۱ |
| <i>p. argyrocoleon</i> | گندآباد | ۵۹/۸۷ | ۱۸/۳۷ | ۵۳/۰۳ | ۳۰/۲۲ | ۲۳ | ٪۲۳ |
| <i>p. aviculare</i> | ارومیه | ۵۱/۵۸ | ۱۵/۴۱ | ۵۷ | ۳۰/۸۵ | ۱۹/۳۰ | ٪۲۵ |
| | خرم‌آباد | ۴۵/۷۴ | ۱۶/۷۲ | ۶۸ | ۳۸/۸ | ۲۵/۵۳ | ٪۲۰ |
| | مهاباد | ۴۳/۴۸ | ۱۷/۶ | ۵۱/۱۴ | ۳۵/۳۴ | ۲۰/۳ | ٪۲۹ |
| | رشت | ۴۴/۹۱ | ۱۹/۲۰ | ۵۷ | ۳۰/۸۵ | ۱۹/۳۰ | ٪۲۵ |
| <i>p. olivascens</i> | بابلسر | ۵۵/۰۳ | ۱۴/۸۱ | ۶۸ | ۳۸/۸ | ۲۵/۵۳ | ٪۲۰ |
| | ساوه | ۴۶/۸ | ۱۸/۹۳ | ۷۵/۸۶ | ۳۳/۸۶ | ۱۹/۰۲ | ٪۲۰ |
| <i>p. patulum</i> | تهران، مسیل درکه | ۳۹/۵۸ | ۱۹/۸۰ | ۷۰/۴۳ | ۴۶ | ۲۴ | ٪۲۲ |
| | ایرپلر | ۴۳/۸۳ | ۱۵/۳۹ | ۸۵/۹۲ | ۳۰/۸۲ | ۲۳/۷۵ | ٪۲۲ |
| <i>p. polycnemoides</i> | میان‌دوآب | ۴۶/۷۹ | ۱۶/۲۳ | ۷۰/۳۲ | ۴۰/۶۱ | ۱۹/۵۴ | ٪۲۰ |
| | آبعلی | ۶۳/۷۳ | ۳۰/۳۴ | ۷۰/۹۸ | ۴۳ | ۲۴/۱۵ | ٪۱۹ |




شکل ۲- میکروگراف فندقه و تزئینات سطحی آن.

Fig. 2. Micrographs of achene and its surface ornamentations in: A-B: *Polygonum arenastrum*, C-D: *P. argyrocoleon*, E-F: *P. aviculare*, G-H: *P. olivascens*, I-J: *P. patulum*, K-L: *P. polycnemoides*.



شکل ۳- نمایش بشرهٔ پوشانندهٔ گلپوش در **A**: *Polygonum arenastrum* جمعیت درکه، **B**: *P. argyrocoleon* جمعیت گندآباد، **C**: *P. aviculare* جمعیت رشت، **D**: *P. olivascens* جمعیت ساوه، **E**: *P. patulum* جمعیت میاندوآب، **F**: *P. polycnemoides* جمعیت آبالی.

Fig. 3. Perianth epidermis in **A**: *Polygonum arenastrum*, Darake population; **B**: *P. argyrocoleon*, Gandabad population; **C**: *P. aviculare*, Rasht population; **D**: *P. olivascens*, Saveh population; **E**: *P. patulum*, Miandoab population; **F**: *P. polycnemoides*, Abali population.



شکل ۴- الگوی بشرهٔ پشتی برگ در **A**: *Polygonum arenastrum* جمعیت ایلام از *P. arenastrum*، **B**: *P. argyrocoleon* جمعیت گندآباد از *P. argyrocoleon*، **C**: *P. aviculare* جمعیت کلاردشت از *P. aviculare*، **D**: *P. olivascens* جمعیت ساوه از *P. olivascens*، **E**: *P. patulum* جمعیت میاندوآب از *P. patulum*، **F**: *P. polycnemoides* جمعیت درکه از *P. polycnemoides*.

Fig. 4. Leaf dorsal epidermis pattern in *Polygonum* **A**: Ilam population of *P. arenastrum*, **B**: Gandabad population of *P. argyrocoleon*, **C**: Kelardasht population of *P. aviculare*, **D**: Saveh population of *P. olivascens*, **E**: Miandoab population of *P. patulum*, **F**: Darakeh population of *P. polycnemoides*.

- Hedberg, O.** 1946. Pollen morphology in the genus *Polygonum* L. sensu lato and its taxonomic significance. – *Svensk Botanisk Tidskrift* 40: 371-404.
- Hong, S.P., Ronse Decraene, L.P. and Smets, E.** 2000. Systematic significance of tepal surface morphology in tribes Persicarieae and Polygoneae (Polygonaceae). – *Bota. J. Linnean Soc.* 127: 91-116.
- Hong, S.P., Oh, I.C. and Ronse De Craene, L.P.** 2005. Pollen morphology of the genera *Polygonum* s. str. and *Polygonella* (Polygoneae : Polygonaceae). – *Plant Sys. and Evo.* 254: 13-30.
- Ingrouille, M.J.** 1986. The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation. – *Taxon* 35: 541-545.
- Keshavarzi, M., Mosaferi, S. and Shojaii, M.** 2012. Leaf anatomical study of the annual species of *Polygonum* s.l. (Polygonaceae) in Iran. – *Phytologica Balcanica* 18:127-133.
- Marek, S.** 1954. Morphological and anatomical features of the fruits of genera *Polygonum* L., *Rumex* L. and keys for their determination. – *Monographiae Botanicae* 2: 77-161.
- Marek, S.** 1958. European genera of Polygonaceae in the light of anatomical and morphological investigations on their fruits and seeds. – *Monographiae Botanicae* 6: 57-79.
- Mosaferi, S. and Keshavarzi, M.** 2011. Micromorphological study of Polygonaceae tribes in Iran. – *Phytologia Balcanica* 17: 89-100.
- Mosaferi, S., Sheidai, M., Keshavarzi and M., Noormohammadi, Z.** 2015. *Polygonum aviculare* (Polygonaceae) sub species, new records for the flora of Iran. – *Mod. Phytomo.* 8: 31-36.
- Mozaffarian, V.** 2012. A revision of *Polygonum* L. sensu lato (Polygonaceae) in Iran. – *Iranian J. Botany* 18: 159-174.
- Nadernezhad, N., Nazeri, V., Poursayyedi, S.** 2004. Study of Morphological characters of Polygonaceae by numerical taxonomy in Kerman province. – *Res. J. Basic Sci. of University of Isfahan* 19:27-38.
- Nazem Bokae, Z., Keshavarzi, M., Gholami, A.** 2015. Stem anatomical study in some annual *Polygonum* L. (Polygonaceae) species in Iran. – *Pajoheshhaye Giahi J.* 28: 647-653.
- Post., M.D.** 1932. *The Flora of Syria, Palestine and Sinai.* 2nd ed. – American Press, Beirut, 701 pp.
- Punt, W., Blackmore, S., Nilsoon, S. and Le Thomas, A.** 1994. – *Glossary of Pollen and Spore Terminology.* Utrecht,- LPP Foundation.
- Qaiser, M.** 2001. Polygonaceae. In: Ali S.I. and Qaiser M. (eds.), *Flora of Pakistan*, No.205, 4-164, University of Karachi, Pakistan.
- Rechinger, K.H. and Schiman-Czeika, H.** 1968. Polygonaceae. In: Rechinger, K.H. (ed.), *Flora Iranica*, 56: 46-83. – *Akademische Drucku. Verlagsantalt, Graz.*
- Yang, J., Li, Y. and Wang, J.A.** 1991. Primary study on the microstructural features of achene surfaces and its taxo-

nomical importance to *Polygonum*. – *Acta Botany Boreal-Occident Sinica* 11: 1-7.

Keshavarzi, M., Gholami, A and Nazem Bokae, Z. 2017. Micromorphological study of some annual *Polygonum* L. (Polygonaceae) in Iran. – *Nova Biol. Rep.* 3: 356-366.

کشاورزی، م.، غلامی، ا. و ناظم‌بکایی، ز. ۱۳۹۵. بررسی ریز ریخت-شناسی تعدادی از گونه‌های یک‌سالهٔ سردهٔ علف هفت‌بند در ایران. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۳: ۳۵۶-۳۶۶.