

گروه خودریختی‌های یک $(3, 19, 115)$ -۲ طرح متقارن

عبدالرضا اسکویی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 غلامرضا صفا کیش‌همدانی: دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
 محمدجواد اسلامپور: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این مقاله گروه خودریختی طرح‌های متقارن با $\lambda = 3$ بررسی شده است، و در حالت خاص، یک $(115, 19, 3)$ -۲ طرح متقارن که وجود یا عدم آن معلوم نیست در نظر گرفته و ثابت شده است که اگر f یک خودریختی از این طرح باشد، آن گاه $o(f) = 2^a 3^b 5^c 7^d 19^e$. همچنین درباره نقاط ثابت این خودریختی‌ها نتایجی به دست آمده است.

۱- مقدمه

فرض کنید X یک v -مجموعه و $P_i(X)$ مجموعه i -زیر مجموعه‌های X باشند. دوتایی $D = (X, \mathbf{B})$ که در آن \mathbf{B} گردایه‌ای از عناصر $P_k(X)$ (معمولاً بلوک نامیده می‌شوند) است، یک (v, k, λ) -۲ طرح بلوکی (یا به طور خلاصه طرح) می‌نامیم. هرگاه هر عضو از $P_2(X)$ ، λ بار در بلوک‌های \mathbf{B} ظاهر شود، اگر $|\mathbf{B}| = v$ آن گاه طرح را متقارن می‌گوییم. در هر طرح متقارن، دفعات ظهور هر عنصر X در بلوک‌های \mathbf{B} برابر با k است.

مثال: قرار دهید $X = \{1, 2, 3, \dots, 7\}$ و

$$\mathbf{B}: \begin{aligned} B_1 &= \{1, 2, 3\} & B_4 &= \{2, 4, 6\} & B_6 &= \{3, 4, 7\} \\ B_2 &= \{1, 4, 5\} & B_5 &= \{2, 5, 7\} & B_7 &= \{3, 5, 6\} \\ B_3 &= \{1, 6, 7\} \end{aligned}$$

ملاحظه می‌شود $D = (X, \mathbf{B})$ ، یک $(7, 3, 1)$ -۲ طرح متقارن است.

نگاشت ψ بین دو طرح $D = (X, \mathbf{B})$ و $D' = (X', \mathbf{B}')$ یک یکرختی نامیده می‌شود، هرگاه

$$\psi: X \rightarrow X' \text{ یک تناظر یک به یک باشد به طوری که } \psi(\mathbf{B}) = \mathbf{B}'.$$

هر یکرختی از یک طرح D به توی خودش را یک خودریختی می‌نامیم. مجموعه کلیه خودریختی‌های

طرح D همراه با عمل ترکیب توابع یک گروه تشکیل می‌دهد که به آن گروه خودریختی‌های طرح می‌گویند

و با $\text{Aut}(D)$ نمایش داده می‌شود. گروه خودریختی‌های یک طرح، راهی برای یافتن طرح است که محققان زیادی از این طریق طرح‌هایی که قبلاً وجود یا عدم آن‌ها معلوم نبوده یافته‌اند.

فرض کنید $f \in \text{Aut}(D)$ و $D = (X, \mathbf{B})$ تعریف می‌کنیم:

$$\text{fix}(f) = \{x \in X : f(x) = x\},$$

$$\text{مدار } x = (x) = \{f(x) : f \in \text{Aut}(D)\}.$$

به سادگی می‌توان مشاهده کرد که مدارها X را افزاز می‌کنند.

اگر $\alpha \in \text{Aut}(D)$ و D یک λ - (v, k, λ) طرح متقارن باشد، آن گاه α یک خودریختی روی بلوک‌ها القا می‌کند که با α_B نمایش می‌دهیم. اگر D یک λ - (v, k, λ) طرح متقارن باشد، آن گاه ارتباط نزدیکی بین α و α_B وجود دارد.

مثال: $(26)(45) = \alpha$ یک خودریختی طرح داده شده در مثال قبل است. با اعمال α روی بلوک‌ها داریم:

$$\alpha_B = (\mathbf{B} \ddagger \mathbf{B}_0)(\mathbf{B} \vdash \mathbf{B}_v).$$

قضیه زیر موسوم به لم کشی فرونیوس است.

قضیه: اگر G گروه جایگشتی روی X و r تعداد مدارهای آن روی X باشد، آن گاه

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{\alpha \in G} |\text{fix}(\alpha)|.$$

لم زیر تعداد بلوک‌های یک λ - (v, k, λ) طرح را بر حسب k ، λ و v به دست می‌دهد.

لم ۱ [۴]: در یک λ - (v, k, λ) طرح $D = (X, \mathbf{B})$ داریم

$$b = |\mathbf{B}| = \lambda \frac{\binom{v}{2}}{\binom{k}{2}}.$$

لم‌های ۲ و ۳ ارتباط بین α و α_B را که α خودریختی یک طرح متقارن است بیان می‌کنند.

لم ۲ [۴]: فرض کنید D یک طرح متقارن و $\alpha \in \text{Aut}(D)$. در این صورت

$$|\text{fix}(\alpha)| = |\text{fix}(\alpha_B)|.$$

لم ۳ [۴]: اگر D یک طرح متقارن و $G \leq \text{Aut}(D)$ ، آن گاه تعداد مدارهای ساخته شده توسط G روی نقاط و بلوک‌ها با هم مساوی‌اند.

لم زیر کران بالایی برای تعداد نقاط ثابت یک خودریختی طرح متقارن ارائه می‌کند که نقش اساسی در ادامه مقاله ایفا می‌کند.

لم ۴ [۲]: فرض کنید D یک λ - (v, k, λ) طرح متقارن و $\alpha \in \text{Aut}(D)$ غیر همانی باشد. اگر $f = |\text{fix}(\alpha)|$ ،

$$f \leq \begin{cases} \frac{1}{4}(v+3k-6) & o(\alpha) \geq 3, \\ \frac{1}{3}(v+2k-4) & o(\alpha) = 2. \end{cases} \quad \text{آن گاه}$$

لم زیر خاصیت مهمی را در مورد طرح‌های متقارن در رابطه با اشتراک بلوک‌ها بیان می‌کند.

لم ۴: هر دو بلوک یک (v, k, λ) - λ طرح متقارن در λ نقطه مشترکند.

۲- نتایج درباره گروه خودریختی طرح‌های متقارن

در این بخش بعضی از نتایج خودریختی‌هایی از مرتبه عدد اول p یک طرح متقارن را ارائه می‌کنیم. سپس

در باره طرح‌های متقارن با $\lambda=3$ نتایج را بیان می‌کنیم.

در سرتاسر این بخش منظور از D یک (v, k, λ) - λ طرح متقارن $D = (X, \mathbf{B})$ است.

لم ۶: فرض کنید $\alpha \in \text{Aut}(D)$ و $o(\alpha) = p$ یک عدد اول باشد در این صورت

الف) اگر $B_1, B_2 \in \text{fix}(\alpha_B)$ و $\lambda < p$ و $x \in B_1 \cap B_2$ آن گاه $x \in \text{fix}(\alpha)$

ب) اگر $x, y \in \text{fix}(\alpha)$ و $\lambda < p$ آن گاه کلیه بلوک‌های شامل x, y ، بلوک ثابت هستند.

ج) اگر $1 > p - 1 > \lambda$ ، آن گاه برای هر بلوک B ، $B \not\subseteq \text{fix}(\alpha)$.

اثبات:

الف) اگر $x \notin \text{fix}(\alpha)$ ، آن گاه $\text{orbit}(x) \subseteq B_1 \cap B_2$ و بنا بر این $|B_1 \cap B_2| \geq p > \lambda$ و این تناقض با لم ۵ است.

ب) چون $x, y \in \text{fix}(\alpha)$ ، بنا بر این اگر $x, y \in B$ ، آن گاه $x, y \in \alpha_B$. اگر $\alpha(B) \neq B$ ، آن گاه مدار

B تحت α شامل حداقل p بلوک است و هر کدام نیز شامل x, y هستند. پس x, y حداقل در p

بلوک ظاهر می‌شوند که این متناقض با $\lambda < p$ است.

ج) فرض کنید $B \subseteq \text{fix}(\alpha)$. اگر B' یک بلوک D باشد، آن گاه $|B \cap B'| = \lambda > 2$. پس B' شامل

حداقل دو نقطه ثابت است. بنا بر قسمت (ب) B' بلوک ثابت است. پس هر بلوک این طرح تحت α

ثابت باقی می‌ماند. در نتیجه α خودریختی همانی است که خلاف فرض است.

لم ۷: فرض کنید D یک $(v, k, 3)$ - λ طرح متقارن و $\alpha \in \text{Aut}(D)$ از مرتبه عدد اول $p \geq 5$ باشد. اگر بلوک

ثابت B_0 شامل m نقطه ثابت باشد، آن گاه

$$|\text{fix}(\alpha)| = \frac{2}{3} \binom{m}{2} + 1.$$

اثبات: فرض کنید x_1, x_2, \dots, x_m ، نقاط ثابت B_0 باشند. هر بلوک دیگر شامل یک زوج از x_i ها بلوک ثابت است (بنا بر لم ۶). برای هر بلوک ثابت B_i ، داریم $|B_i \cap B_0| = 3$ (بنا بر لم ۵) و

$$B_i \cap B_0 \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$$

حال مجموعه زیر را در نظر بگیرید.

$$S = \{(\{x_i, x_j\}, B) \mid x_i, x_j \in \{x_1, \dots, x_m\}, x_i, x_j \in B, B \neq B_0\}.$$

$|S|$ را به دو صورت می‌شماریم. هر بلوک ثابت شامل سه عضو از مجموعه $\{x_1, \dots, x_m\}$ است تعداد بلوک‌های ثابت به غیر از B_0 برابر $|fix(\alpha)| - 1$ است. پس $|S| = 3(|fix(\alpha)| - 1)$. از طرف دیگر هر زوج از عناصر مجموعه $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ به غیر از B_0 در دو بلوک ثابت دیگر ظاهر می‌شود. پس $|S| = \binom{m}{2} \times 2$ و

$$\text{در نتیجه } |fix(\alpha)| = \frac{2}{3} \binom{m}{2} + 1.$$

لم ۸: با مفروضات لم ۷، تعداد نقاط ثابت کلیه بلوک‌های ثابت D ، برابر با m است.

اثبات: فرض کنید B_1 و B_2 دو بلوک ثابت با تعداد نقاط ثابت m و m' باشند. در این صورت

$$|fix(\alpha)| = \frac{2}{3} \binom{m}{2} + 1 = \frac{2}{3} \binom{m'}{2} + 1$$

در نتیجه $m = m'$.

نتیجه ۱: با مفروضات لم ۷، یک $(|fix(\alpha)|, m, 3)$ - ۲ طرح متقارن درون طرح D وجود دارد.

اثبات: قرار دهید $\mathbf{B}' = \{B \cap fix(\alpha) \mid B \in fix(\alpha_B)\}$. با توجه به روند اثبات لم ۸، \mathbf{B}' گردایه‌ای از مجموعه‌های m -عضوی است. با توجه به لم ۸، \mathbf{B}' مجموعه بلوک‌های یک $(|fix(\alpha)|, m, 3)$ - ۲ طرح متقارن است.

لم ۹: با مفروضات لم ۷، اگر $o(\alpha)$ مساوی ۲ و یا ۳ باشد، آن گاه

$$|fix(\alpha)| \leq \frac{2}{3} \binom{m}{2} + 1.$$

اثبات: چون در این حالت ممکن است اشتراک دو بلوک ثابت، مجموعه نقاط ثابت نباشند، بنا بر این در روند اثبات لم ۷، تعداد بلوک‌های ثابت شامل یک زوج از عناصر $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ، حداکثر $|fix(\alpha)| - 1$ است. از این‌جا مطلوب حاصل می‌شود.

لم ۱۰: با مفروضات لم ۷، $|fix(\alpha)| + |fix(\alpha)|(k - m) \leq v$.

اثبات: چون اشتراک هر دو بلوک ثابت زیرمجموعه‌ای از نقاط ثابت است، پس هر بلوک ثابت دارای $k - m$ نقطه است که در هیچ کدام از بلوک‌های ثابت دیگر ظاهر نمی‌شود. حال شمارش نقاط در بلوک‌های ثابت به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

لم‌های ۷ و ۹، نقش اساسی در بررسی خودریختی‌های از مرتبه عدد اول p یک (v, k, λ) - 2 طرح متقارن بازی می‌کند و در بخش سوم خواهیم دید که نتایج لم ۷ و ۹ نتایج قوی‌تری نسبت به لم ۴ را به دست می‌دهد.

۳- گروه خودریختی یک $(115, 19, 3)$ - 2 طرح متقارن

در این بخش به بررسی گروه خودریختی یک $(115, 19, 3)$ - 2 طرح متقارن می‌پردازیم. وجود یا عدم این طرح هنوز مشخص نشده است [۳]. همان‌طور که در بخش ۱ مطرح کردیم، گروه خودریختی طرح‌ها راهی برای یافتن طرح است. در این بخش، D را یک $(115, 19, 3)$ - 2 طرح متقارن گرفته و خودریختی‌های از مرتبه عدد اول p آن‌ها را بررسی می‌کنیم. فرض کنیم $\alpha \in \text{Aut}(D)$ و $o(\alpha) = p$ عددی اول باشد. بر اساس قضیه‌ای از Aschbacher [۱] که بیان می‌کند اگر α یک خودریختی (v, k, λ) - 2 طرح متقارن از مرتبه عدد اول p باشد، آن‌گاه $p \mid v$ یا $p \leq k$ ، داریم

$$p \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}.$$

الف: $o(\alpha) = 17$

در این حالت، بنا بر لم‌های ۱ و ۴، $|\text{fix}(\alpha)| \in \{13, 30\}$. اگر B یک بلوک ثابت باشد، آن‌گاه بنا بر لم‌های ۶

$$(ج) \text{ و } ۱۰، B \text{ دقیقاً } ۲ \text{ نقطه ثابت دارد. پس، } |\text{fix}(\alpha)| = \frac{2}{3} \binom{2}{2} + 1 = ۱، \text{ که عدد صحیح نیست. پس}$$

$$| \text{Aut}(D) | \mid 17.$$

ب: $o(\alpha) = 13$

مجدداً بنا بر لم ۴، $|\text{fix}(\alpha)| \in \{11, 24\}$. لم ۶ (ج) دلالت بر این دارد که هر بلوک ثابت دارای شش نقطه ثابت

است و بنا بر این $|\text{fix}(\alpha)| = 11$. نتیجه ۱ دلالت بر این دارد که یک $(11, 6, 3)$ - 2 طرح متقارن درون ساختار

این طرح وجود دارد. اما این متناقض با لم ۱۰ است. پس عدد ۱۳ مرتبه گروه خودریختی را عا د نمی‌کند.

ج: $o(\alpha) = 11$

لم ۴ نتیجه می‌دهد که $|\text{fix}(\alpha)| \in \{5, 16, 27, 38\}$. که همه موارد مشابه حالت‌های قبل رد می‌شود. پس

$$| \text{Aut}(D) | \mid 11.$$

د: $o(\alpha) = 7$

مجدداً داریم $|\text{fix}(\alpha)| \in \{3, 10, \dots, 38\}$. هر بلوک ثابت ۵ یا ۱۲ نقطه دارد. اگر همه بلوک‌ها ۵ نقطه ثابت

داشته باشند. در این صورت لم ۸ دلالت دارد که $|\text{fix}(\alpha)|$ عدد صحیح نیست. پس بلوکی وجود دارد که ۱۲ نقطه

ثابت دارد. در نتیجه بنا به لم ۸، $|\text{fix}(\alpha)| = 45$ که غیر ممکن است. پس $| \text{Aut}(D) | \mid 7$.

$$o(\alpha) = 5: \text{ه}$$

در این جا $|\text{fix}(\alpha)| \in \{0, 5, \dots, 40\}$ که همه حالت‌ها به جز $|\text{fix}(\alpha)| = 0$ بنا به لم ۷ رد می‌شود.

لم ۱۱: اگر $|\text{Aut}(D)| \mid 5^\beta$ آن گاه $\beta \leq 1$.

اثبات: فرض کنید $G \leq |\text{Aut}(D)|$ از مرتبه ۲ باشد. پس $G \simeq C_5 \times C_5$ یا $G \simeq C_{25}$. حالت $G \simeq C_{25}$ به سادگی رد می‌شود. پس $G \simeq C_5 \times C_5$ و در نتیجه مرتبه هر عنصر ۵ است. پس هیچ‌کدام از عناصر G به جز عنصر همانی نقطه ثابت ندارند. بنا بر لم کشی-فروبینیوس،

$$r = \frac{1}{25} \sum \text{fix}(\alpha) = \frac{115}{25}.$$

که یک تناقض است. پس $5^2 \nmid |\text{Aut}(D)|$.

$$o(\alpha) = 19: \text{و}$$

در این جا $|\text{fix}(\alpha)| = 1$ و مشابه لم ۱۱، $19^2 \nmid |\text{Aut}(D)|$.

قضیه زیر خلاصه بحث‌های فوق است:

قضیه: اگر $f \in \text{Aut}(D)$ ، آن گاه $o(f) = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma 19^\sigma$ که در آن

$$\text{الف) } \beta, \gamma, \sigma \leq 1;$$

ب) اگر $o(f) = 19$ ، آن گاه $|\text{fix}(\alpha)| = 1$ ؛

ج) اگر $o(f) = 5$ ، آن گاه $|\text{fix}(\alpha)| = 0$ ؛

منابع

1. M. Aschbacher, *On Collination Groups of Symmetric Block Design*, J. Combinatorial Theory Ser. A **11** (1971) 272-281
2. Bowler, *On the fixed points of an Automorphism of a symmetric design*, J. Combin. Theory Ser. A **43** (1986), 350-343.
3. Brouwer, *Block designs*, pp. 693-745 in Handbook of Combinatorics (ed. R.L. Graham, M. Grotscel, L. Lovasz), Elsevier, Amsterdam (1995).
4. E. Lander, *Symmetric designs: an algebraic approach*, Cambridge University Press, Cambridge (1983).