

اثر پروستاگلاندین₂ آلفا در رفتار جنسی موش نر بالغ نزاد/c Balb

دکتر پروین رستمی - بهمن فخریان - ناصر ولانی*

گروه زیست‌شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه تربیت معلم

علیرغم این حقیقت که اولین بار با غلظت بالا در منی انسان و حیوانات جدا شده با اینحال نقش آنها در فیزیولوژی تولید مثل دقیقاً مشخص نشده است. در جنس ماده با تاثیر پروستاگلاندین ها (PGS) نتایجی بدست آمده از جمله در ۱۹۷۵ توسط Lippss نقش آنها در داخل لوله فالوب و سیکل استروس به صورت تاثیر روی حرکات دودی لوله‌ای و فعالیت مژه‌ای و انتقال اووم بیان گردیده است. (۱)

در ۱۹۸۸ پروستاگلاندینها را به عنوان واسطه در تخمک‌گذاری با القاء LH معرفی نمودند و نیز نقش آنها در ایجاد لوتولیز و کاهش ترشح بروژسترون بیان شده است. (۲) مهار اوولاسیون توسط ایندومتاسین و آسپیرین که از مهار کننده‌های سنتز PG هستند نیز بیان گر مداخله PGS در اوولاسیون می‌باشد. (۳) و (۴)

در ۱۹۷۵ اثر تحریکی₂ PGE₂ در افزایش LH سرمی در نر معرفی شده و نظر بر اینست که از طریق آزاد سازی نوروهورمونهای هیپotalاموس بر آزاد سازی LH اثر می‌گذارد. در ۱۹۷۷ به دنبال تجویز PG مرفلولوژی اندام تناسلی نر بررسی و گزارشی مبنی بر وجود Edema درون لوله‌ای به همراه آتروفی Peripheral پیشه ارائه گردید. (۵)

در ۱۹۸۰ نیز با تاثیر PGS مختلف روی Rat نتایج فوق تأیید گردید. (۶)

چکیده: نقش پروستاگلاندینها در تخمک گذاری موجودات ماده با القاء LH شناخته شده است ولی اثر PGS بر فعالیت و رفتار جنسی موجود نر کاملاً "شناخته شده" نیست. به منظور مطالعه تاثیر پروستاگلاندین₂ آلفا بر رفتار جنسی موش نر، مشاهدات نر بالغ نزاد/c Balb در سه گروه تجربی که به ترتیب ۱۰ ug/ml و ۱۰۰ ug/ml و ۱۰۰۰ ug/ml PGF_{2α} به صورت دوز منفرد درون صفاقی دریافت می‌کردند و دو گروه کنترل و sham که گروه اول بدون تزریق و گروه دوم سالین دریافت می‌کردند مورد بررسی قرار گرفتند مه ساعت پس از تزریق هر موش نر را با یک موش ماده در یک قفس قوارداده و صبح روز بعد با مشاهده VP تمایل جنسی ارزشیابی می‌گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تزریق دوزهای مختلف PGF_{2α} بر تمایلات جنسی موش های نر مورد آزمایش تاثیر معنی دار نداشته است و این ماده را نمی‌توان به عنوان القاء کننده تمایلات جنسی در موش نر یکار برد.

مقدمه: پروستاگلاندینها گروهی از اسیدهای چرب حلقوی با اثرات بیولوژیکی بسیار قوی و وسیع هستند که تقریباً در فعالیت سیستم زیستی انواع گونه‌ها از جمله انسان دخالت دارند.

در ۱۹۸۴ بیان شد که حداقل قسمتی از فعالیت تحریکی E₂ و PGE1 با آزادسازی نوراپی نفرین مکانیسمی آدرنرژیکی را به همراه دارد.^(۸)

در ۱۹۸۵ با اشاره به این که منی انسان مقدار متفاوتی از PGS را در بردارد نقش 19-OH-PGF و 19-OH-PGE را در تنظیم حرکت اسپرماتوزیم در موکرس واژنی و نفوذ آنها در اووسیت موثر و مفید بیان گردید.^(۹)

در ۱۹۸۹ Schramek، برای ایجاد نمود (erection) در مردان قادر توانائی جنسی از PGE استفاده کرد و اثر آن را به صورت واپسیت به دوز به همراه دردهای موضعی نشان داد.^(۱۰)

Schramek و همکاران در ۱۹۹۰ Muttarellie و همکاران و نیز Merck و همکاران در ۱۹۹۱ نیز مقالاتی در این خصوص ارائه دادند که همه آنها به کاربرد PGE جهت ایجاد erection فارماکولوژیک اشاره نموده‌اند.^{(۱۱) و (۱۲) و (۱۳).}

در ۱۹۹۱ Blumberg در مقاله‌ای تحت عنوان نقش PGE₂ در تسريع رفتار جنسی Rat نتیجه گرفت که رفتار جنسی با افزایش درجه حرارت همراه است و ممکن است حداقل قسمتی از این افزایش با آزاد شدن PGS سرمنی E واسطه گردد. و به همین منظور PGE₂ را به درون حفرات معزی تزریق و رفتار جنسی و افزایش درجه حرارت را در آنها بررسی کرد.^(۱۴)

همچنین در همان سال رستمی و همکاران با تاثیر PGF_{2α} روی وزغ نر نزاد Bufo viridis اثر آن را به صورت افزایش رفتار در برگیری وزغ ماده نشان دادند.^(۱۵)

در این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات PGF_{2α} بر رفتار جنسی، دوزهای مختلف آن به صورت درون صفاقی به موش نر نزاد Balb/c تزریق گردید.

روش اجرایی:

در این تحقیق از موش‌های سفید آزمایشگاهی نزاد Balb/c استفاده شد. موش‌های نر ۴/۵ ماهه بارور (باروری

موشها در یک آمیزش قبلی مشخص شده بود) و در محدود وزنی بین ۲۵ - ۳۰ گرم انتخاب گردیدند. روش تزریق صورت درون صفاقی و تجربیاتی به صورت زیر انجام گرفت

۱- گروه کنترل - ۱۰ مoush - بدون تزریق

۲- گروه Sham - ۱۰ مoush - به هر کدام ۱ml Ringer پستاندار تزریق گردید.

۳- گروه‌های تجربی Exp شامل سه گروه، هر گروه مoush.

الف: گروه تجربی ۱ به هر حیوان 1ml محلول α PGF_{2α} غلظت ۱۰ ug/ml ۱ تزریق شد.

ب: گروه تجربی ۲ به هر حیوان 1ml محلول α PGF_{2α} غلظت ۱۰۰ ug/ml ۱ تزریق شد.

ج: گروه تجربی ۳ به هر حیوان 1ml محلول α PGF_{2α} غلظت ۱۰۰۰ ug/ml ۱ تزریق شد.

جهت بررسی رفتار جنسی، موشها نر با موشها مبارور بالغ با محدوده وزنی ۲۵ - ۳۰ گرم در قفس‌های جداگانه آمیزش قرار گرفته. با توجه به این که احتمال داشتن موشها ماده همه از لحاظ سیکل جنسی در یک مرحله نباشند و هنگام قرارگیری در یک قفس با موش نر آمادگی آمیزش را نداشته باشند جهت پذیرا کردن موشها ماده واطمیتان از تمایل به آمیزش با استفاده از روش بکار برده شد توسط Donald (۱۹۷۲)، تزریق هورمونهای جنسی استروز و پرورزسترون به طریق زیر انجام گردید.^(۱۶) سه روز قبل از تزریق α PGF_{2α} به نرها و آمیزش دادن بامداده‌ها در هنگام تزریق به تمامی موشها ماده گروههای کنترل و Sham و گروههای تجربی ۸ میکروگرم استروزون تزریق و این کار سه روز متعاقباً ادامه داده شد، روز سوم ۴ ساعت قبل از آمیزش به آنها ۸ میکروگرم پرورزسترون تزریق گردید. با این تزریقات تمهیز موشها ماده آمادگی جفتگیری را پیدا کردند.

سه ساعت قبل از آمیزش به موشها نر تجزیی دوزتای مورد نظر α PGF_{2α} و به گروه Sham، رینگر پستانداران تزریق شد. زمان کنار هم قراردادن موشها نر و ماده یکسان شد. زمان کنار هم قراردادن موشها نر تجزیی دوزتای α PGF_{2α} و به گروه کنترل و ۲ گروه تجربی دوزتای α PGF_{2α} و به گروه Sham، Ringer پستانداران تزریق شد. زمان کنار هم قراردادن موشها نر و ماده یکسان شد.

آمادگی داشتند. تزریق α PGF₂ به نرها و آمیزش دادن آنها با ماده‌های دست نخورده intact، در هر دو مورد فوق گروههای Sham که به آنها رینگر پستانداران تزریق می‌شد و گروه کنترل که تزریق دریافت نمی‌داشتند. پارامتر مورد نظر مشاهده V.P بوده است در صورت مشاهده V.P نتیجه گرفته می‌شد که موشهای نری که با ماده در یک قفس قرار داشته رفتار جنسی و آمیزش بروز کرده است و میل جنسی در آن وجود داشته است.

گروه الف:

نتایج در جدول ۱ به صورت تعداد V.P مشاهده شده و درصد آن نشان داده شده است. با توجه به این که در این مورد تکرار ضروری نبوده است نتایج آماری فقط با مقایسه درصد انجام گرفته است. گراف ۱ مقایسه نتایج را نشان می‌دهد. همانگونه که در جدول و گراف دیده می‌شود اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف از نظر بروز تمایل جنسی پس از تزریق دوزهای مختلف α PGF₂ و رینگر با کنترل مشاهده نگردید.

گروه ب:

نتایج آن در جدول ۲ و گراف ۲ با هم مقایسه شده است و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف پس از تزریق دوزهای مختلف و رینگر با کنترل مشاهده نشد.

بحث و تفسیر:

بررسی نتایج این تحقیق نیز نشان می‌دهد که تزریق دوزهای مختلف پروستاگلاندین F_2 آلفا (100 و 1000) میکروگرم بصورت دوز منفرد تاثیری معنی‌دار بر رفتار جنسی نداشته است و نتایج بدست آمده در پستانداران ترا با دوزیست نر متفاوت می‌باشد.

در این رابطه تاکنون تحقیقی در مورد تاثیر α PGF₂ بر باروری پستاندار نرا ارائه نشده است. در تحقیقی که در سال ۱۹۹۱ توسط رستمی و همکاران (۱۷) روی وزغ گونه Bufo Viridis

ساعت بعد از تزریق α PGF₂ و معمولاً "ین ساعات ۹ - ۷ ساعت از ظهر بوده است. صبح روز بعد بین ساعت ۸ - ۷ صبح موشهای ماده را از قفس خارج و جهت اطلاع از آمیزش وجود یا عدم وجود در پوش واژنی (V.P) مورد بررسی قرار گرفت که پارامتر مورد نظر در این کار تحقیقاتی برای بررسی اثر α PGF₂ بر تمایل و رفتار جنسی بوده است. تعداد واژینال پلاک در هر گروه شمارش و موشهای ماده از نرها جدا گردیدند. این احتمال داده می‌شد که تزریق هورمونهای جنسی به موشهای ماده در کار طبیعی بدن آنها اختلال ایجاد نماید. معهذا تعداد واژینال پلاک مشاهده شده نشان داد که تزریق هورمونها به روش ذکر شده میل جنسی در ماده‌ها را فزایش داده است. معهذا چون تزریق در سیکل تحمل‌گذاری اثر می‌گذارد لذا تجربه با روش دیگری تکرار گردید. این بار از موشهای ماده بدون تزریق هورمون، گسترش واژنی Vaginal smear تهیه گردید تا از زمان سیکل آنها اطلاع حاصل شود و موشهای هم سیکل مورد استفاده قرار گیرند. با بررسی متولی موشهای ماده و انجام مراحلی جهت هم سیکل کردن آنها نتیجه مطلوب بدست نیامد و تاهمانگی شدیدی در سیکل جنسی موشهای ماده مشاهده شد علت این امر احتمالاً تحریک واژن توسط قطره چکان و آب مقطر بود که در سیکل جنسی آنها اختلال ایجاد می‌کرد، لذا در بارسوم موشهای ماده دست نخورده intact که مدتی را در کنار هم قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد موشهایی که در این گروه مورد بررسی قرار گرفت معادل گروههای قبل بود.

نتایج بدست آمده در هر دو مورد با تزریق هورمونهای جنسی و بدون تزریق آن به صورت درصد V.P مشاهده شده که در بخش نتایج آمده است.

نتایج:

همانطور که گفته شد تحقیق به دو روش انجام گرفت.
الف: تزریق α PGF₂ به نرها و آمیزش آنها با موشهای ماده‌ای که به کمک تزریق هورمونهای جنسی برای آمیزش

از این گزارشها مستقیماً به کاهش یا افزایش رفتار جنس نر اشاره‌ای نکرده‌اند.

تشکر و قدردانی:

این طرح تحقیقاتی توسط شورای دانشگاه علوم شهید بهشتی تصویب و بودجه آن نیز توسط آن دانشگاه است. بدینوسیله از شورای محترم پژوهشی علوم پزشکی شهید بهشتی قدردانی می‌گردد. ضمناً مشاورت جناب آقای دکتر علی حائری روح ثمر رسیدن این طرح راهنمای وارزنه بوده و از سپاسگزاری می‌شود.

انجام گرفت نشان داده شد که $\text{PGF}_2\alpha$ موجب بروز رفتار جنسی از جمله در آغوش‌گیری قورباغه ماده می‌شود. در مورد PGE گزارش‌های ارائه شده است از جمله، Blumberg (۱۹۹۱) گزارش می‌کند که PGE روی Rat ماده موجب تسریع رفتار جنسی همراه با افزایش درجه حرارت بدن می‌گردد. همچنین محققین با استفاده از PGE در مردانی که ناتوانی جنسی داشته‌اند (erectile dysfunction) با نعروط فارماکولوژیک مشاهده کرده‌اند که خود نشانه‌ای از بروز رفتار جنسی در جنس نر است. (Schramek ۱۹۸۹ - Merck ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱). در ضمن گزارش‌هایی مبنی بر تغییر میزان هورمونهای جنسی تحت تاثیر PGS ارائه شده ولی هیچکدام

ferences:

- 1- Lippes, J. (1975): *Applied Physiology of the uterine tube, in obstetrics and Gynecology Annual*. New York, Appleton-Century-Crofts, 5 P. 119.
- 2- Mahmoud, I. Y., Cyrus, R.V. and al, (1988): *The effect of arginine Vasotocine PGF2 α on oviposition and Luteolysis in the common snapping Turtle chelydraser Pentena*, Gen. Comp. Endocrinology- 69:56-1988.
- 3- Armstrong, B. T., and Grind Vich, D. L. (1972): *Influence of spontaneous and LH induced ovulation in rats by indomethacin an inhibitor of PG biosynthesies, Prostaglandins*, 1: 21, 1972.
- 4- Hamada, J. et al, (1977) *ovulation in the perfused rat ovary: The influence of PG and PG inhibitors* Reprod. 17:58.
- 5- Chohsieng, PL (1975). *Stimulatory effect of PGF $_2\alpha$ on LH release in the rat*. Neuroendocrinology, 22: 17.
- 6- Kaly, I., et al. (1977): *Testicular morphology during PG administration*. Univ. College of pharmacy Annals XV, 114- 119.
- 7- Bidolkar, A. K. (1980): *Effect of PGA1, E2, E3 on Spermatogenesis in rats*. J. Reprod. Fert. 27: 127.
- 8- Almeno, M. F., & et al, (1984): *Role of endogenous and exogenous PGS on the contractile*

functioning of isolated, sow oviducts. Prostaglandins May 1984, Vol. 27, No 5, Page 737- 752.

9- Aitken, R., & Kely (1985): *Analysis of the direct effect of PGS on human sperm function*. Journal of Reproduction & fertility, 73, 139- 146.

10- Schramek, P., Waldhauser, M.(1989): *Dose-dependent effect and side effect of PGE1 in erectile dysfunction*. Br. Y. Clin. pharmacol. Nov. 28(5): 567- 71.

11- Schramek, P. et al, (1990); *PGE1 in eractile dysfunction efficiency and incidence of Priapism*. Br. Y. Urol. 1990/ Jan. 65(1): 68- 71.

12- Muttarellie, G. and Leibundgnt, B. (1991): *initial experiences with PGE1 and PGE1 Prepared injections*, Helv. Chiv. Acta. Sep. 58(3), 335- 7.

13- Merck X, L. et al (1991): *The use of PGS for diagnosis and treatment of erectile impotence*. Ady-urology 59(3): 17- 52.

14- Blumberg- Ms, (1991): *PGF2 accelerates sexual behavior in male Rats*. physiol- Behav. 1991- Jul 50(1): 95- 99.

15- Rostami, p. Tafreshi,a (1992) *The effect of PGF $_2\alpha$ on Sexual behavior in male Bufo Viridis. (Ms.thesis)*

16- Donald, c. et al: (1972): *Hor. and Beh.* 3, 123-131


جدول شماره ۱: «تعداد و V.P مشاهده شده در ماده‌های آماده شده با تزریق Es+ Pro و جفت داده درصد شده با فرآهای تیماری و کنترل».

تیمارها n=10	CO	SH.	EXP.1	EXP.2	EXP.3
$\bar{x} \pm S.D.$ مشاهده شده	۸	۷	۹	۸	۸
In P < 0.05 درصد	٪۸۰	٪۷۵	٪۹۰	٪۸۰	٪۸۰

جدول شماره ۲: «تعداد و درصد V.P. مشاهده شده در ماده‌های دست نخورده جفت داده شده با فرآهای تیماری و کنترل».

تیمارها n=10	CO	SH.	EXP.1	EXP.2	EXP.3
$\bar{x} \pm S.D.$ مشاهده شده	۳	۴	۳	۴	۴
In P < 0.05 درصد	٪۳۰	٪۴۰	٪۳۰	٪۴۰	٪۴۰

Comp. No.of V.P.* observed in Prepared female With
ES.** & PRO.*** that Copulated With treated male by
PGF₂α & Saline



GRAPH 1

Vaginal Plug ** Estradiol *** Progesterone