

بررسی تأثیر تغذیه اولیه بر رشد لارو نارس قزل آلاى رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

ابرهیم حسینی نجدگراى، رامین منافى، سعید مشکینی، بهنام سلیمی: دانشگاه ارومیه

چکیده

ناپلى و سيست کپسول‌زدايى شده آرتما کاربرد وسيعى در صنعت آبى‌پرورى دنيا دارد. در تغذيه و پرورش بسيارى از گونه‌هاى ماهيان آب شيرين و دريائى کاربرد ناپلى و سيست کپسول‌زدايى شده آرتما تأثيرات خوبى را در برداشته است. در اين پژوهش تأثير نوع تغذيه اوليه بر رشد لارو نارس قزل‌آلاى رنگين کمان بررسي شده است. لاروهاى نارس که تازه تغذيه فعال آن‌ها شروع شده بود در پنج تيمار غذايى سيست کپسول‌زدايى شده، ناپلى آرتما، مخلوط سيست کپسول‌زدايى شده و غذاى فرموله شده، مخلوط ناپلى و غذاى فرموله شده و بالاخره غذاى فرموله شده به مدت ۲۰ روز تغذيه شدند و سپس در ادامه کار به مدت ۲۰ روز ديگر با غذاى فرموله شده تغذيه شدند. نتايج تغذيه با ۵ تيمار غذايى آرتما در ۲۰ روز اول نشان داد که رشد لاروها در تيمار غذايى ناپلى، داراى اختلاف معنى‌دار با ساير تيمارها بود. براى بررسي تأثيرات بعدى تغذيه با اين تيمارها، پرورش دوره ۲۰ روزه دوم در همه تيمارها، با غذاى فرموله شده انجام گرفت. نتايج نشان داد که آهنگ رشد لاروهاى تغذيه شده با مخلوط سيست کپسول‌زدايى شده و غذاى فرموله شده نسبت به ساير تيمارها بالاتر و معنى‌دار بود و وزن لاروها در اين تيمار از ۰/۵ گرم به ۲/۲ گرم رسيده بود. ضريب رشد ويژه در اين تيمار ۴/۸ بود که داراى بالاترين مقدار در بين تيمارها بود. همچنين ضريب تبديل غذايى داراى پايين ترين مقدار (۱/۰۷) در بين تيمارهاى مورد بررسي در ۲۰ روزه دوم بود. لاروها در پارامترهاى فاکتور وضعيت، رشد ويژه، مقدار غذاى روزانه، ضريب تبديل غذايى و % Daily Feeding rate داراى اختلاف معنى‌دار بودند. اختلاف معنى‌دار در پارامترهاى بقاء، قابليت تبديل غذايى مشاهده نشد. بالاترين رشد در دوره ۲۰ روزه دوم در تيمار سوم (مخلوط سيست دکپسوله و غذاى فرموله شده) مشاهده شد.

مقدمه

در پرورش اغلب ماهيان دريائى و آب شيرين از غذاى زنده براى تحريك شروع تغذيه اوليه و افزايش بقا استفاده مى‌کنند. بنا بر اين، پرورش زئوپلانکتون‌هاى وحشى به‌عنوان يک منبع غذايى زنده براى تغذيه و طى شدن مراحل اوليه لارو ماهيان احتياج به کاربرد امکانات و صرف هزينه زياد دارد که معمولاً در اين گونه موارد براى توليد محدوديت‌هاى وجود دارد [۵]. دربرخى ازگونه‌ها استفاده از غذاى زنده تا ۷۹٪ هزينه دوره

واژه‌هاى کلیدی: تغذیه اولیه، رشد، لارو، قزل آلا، آرتما

پذيرش ۸۶/۹/۱۱

دریافت ۸۵/۰۷/۱۰

پرورش لارو را در بر می‌گیرد [۱۲]. بنا بر این امکان ادامه تغذیه با غذای زنده به علت هزینه گزاف آن، در بقیه مراحل زندگی لاروها وجود ندارد و پرورش دهندگان مجبورند برای افزایش رشد، بقا و مقاومت لاروها فقط در مراحل اولیه، از غذاهای زنده استفاده کنند. ولی سؤال این‌جاست که لاروهای تغذیه شده با این تیمارهای غذای زنده تا چه مدت آهنگ رشد، بقا و مقاومت خود را حفظ می‌کنند؟ بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آرتمیا بر لارو تاسماهی ایرانی و فیل ماهی نشان داد لاروهایی که در مراحل اولیه با غذای فرموله شده و یا مخلوط غذای فرموله شده و ناپلی آرتمیا تغذیه شدند بر خلاف سایر تیمارها در مراحل بعدی، دارای رشد و بازماندگی زیاد بودند [۱]. همچنین نتایج بررسی لاروهای ماهی آزاد دریای خزر نتایج مشابه در برداشت [۳]. در این پژوهش با بررسی تأثیرات تغذیه لاروهای قزل‌آلای رنگین کمان با پنج تیمار غذایی آرتمیا، آهنگ رشد لاروها و سایر پارامترهای غذایی در مراحل بعدی، بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

لاروهای نورس بررسی شده در این پژوهش، از کارگاه «قزل ماهی» در اطراف ارومیه در سال ۱۳۸۴ تهیه شده بودند و لاروها به سالن پرورش لارو آبزیان دانشگاه ارومیه منتقل شدند و در تانکرهای ۳۵ لیتری با تراکم ۳۵۰ لارو در هر تانکر ذخیره‌سازی شدند. آب مورد استفاده در این سالن از چاهی در نزدیکی سالن پرورش تهیه می‌شد. درجه حرارت و مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره پرورش ثابت و به ترتیب حدود ۱۴ درجه سانتی‌گراد و ۷/۵ میلی‌گرم در لیتر بود. لاروها به مدت ۲۰ روز با پنج تیمار غذایی آرتمیا شامل سیستم کپسول‌زدایی شده، ناپلی آرتمیا، سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده، ناپلی آرتمیا و غذای فرموله شده و بالاخره غذای فرموله شده تغذیه شدند. لازم به ذکر است که هر تیمار شامل ۳ تکرار بود. سیستم‌های مورد استفاده برای کپسول‌زدایی و تخم‌گشایی از گونه آرتمیای دوجنسی دریاچه ارومیه (*Artemia Urmiana*) بودند که با توجه به روش استاندارد کپسول‌زدایی شدند [۱۳]. همچنین برای استفاده از ناپلی آرتمیا، سیستم‌ها در شرایط استاندارد به مدت ۲۴ ساعت در آب شور ۳۵ گرم در لیتر و درجه حرارت ۲۸ درجه هج شدند [۱۳]. تراکم ناپلی آرتمیا با توجه به درصد وزن لاروها و با توجه به جدول غذایی استاندارد تعیین می‌شد [۱۰]. غذای فرموله شده تجاری مورد استفاده در این طرح دارای ۴۸-۵۲ درصد پروتئین، ۱۴-۱۳ درصد چربی و دارای مواد مغذی دیگر بود.

پس از اتمام دوره ۲۰ روزه اول، تغذیه با ۵ تیمار غذایی آرتمیا قطع و لاروها فقط با غذای فرموله شده تجاری تغذیه را ادامه دادند. در ۲۰ روزه دوم، لاروها هر پنج روز یکبار زیست‌سنجی می‌شدند. برای اندازه‌گیری طول کل و وزن تراز کولیس با دقت $\pm 0/01$ میلی‌متر و ترازوی دیجیتال با دقت $\pm 0/0001$ میلی‌گرم استفاده شد.

غذادهی با غذای فرموله شده با توجه به جدول غذایی بر اساس وزن و درجه حرارت آب صورت می‌گرفت و غذای روزانه تانکرها یادداشت می‌شد [۱۰].

علاوه بر اندازه‌گیری پارامترهای طول و وزن لاروها، با توجه به مقدار غذادهی، فاکتور وضعیت^۱، درصد افزایش وزن^۲، ضریب رشد ویژه^۳، بقا، مقدار غذای روزانه به ازای هر لارو^۴، ضریب تبدیل غذایی^۵، کارایی غذایی^۶، مقدار غذای روزانه^۷ محاسبه شد. برای اندازه‌گیری پارامترهای یاد شده از فرمول‌های مربوط به آن استفاده شد [۷]:

$$CF = w / L^3$$

$$\text{Growth Rate} = [(w_2 - w_1) / w_1] * 100$$

$$\text{Daily feed intake (g/fish)} = (\text{Feed intake (gr)} / \text{Number of fish}) / \text{day}$$

$$SGR = 100 * (\ln w_2 - \ln w_1) / (t_2 - t_1)$$

$$FCR = \text{افزایش وزن} / \text{مقدار غذا}$$

$$\text{Feeding Efficiency} = 100 / FCR$$

$$\text{Growth Efficiency} = SGR / \text{Daily Feeding Rate}$$

$$\text{Daily feeding rate\%} = \{ \text{daily feed intake (g)} / (\text{final weight} + \text{initial weight}) / 2 \} * 100$$

که در فرمول‌های بالا W وزن تر بر حسب گرم، L طول کل بر حسب سانتی‌متر و t زمان بر حسب روز است. داده‌های به دست آمده پس از ویرایش در نرم افزار آماری SPSS، با آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و تست Duncan تجزیه و تحلیل شدند. برای رسم نمودارها از برنامه Excel استفاده شد.

نتایج

تجزیه و تحلیل داده‌ها با SPSS نشان داد که لاروهای بررسی شده در پارامترهای وزن نهایی، فاکتور وضعیت، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، مقدار غذای روزانه به ازای هر لارو، ضریب تبدیل غذایی، مقدار غذای روزانه در تیمارهای مورد بررسی در ۲۰ روز دوم دارای اختلاف معنی‌دار بودند ($p < 0.05$). اختلاف معنی‌دار در فاکتورهای بقا و کارایی غذایی (Feeding Efficiency) در لاروهای مورد بررسی مشاهده نشد.

۱. Condition factor	۲. Growth rate%	۳. Special growth rate	۴. Daily feed intake
۵. Feed conversion rate	۶. Feed efficiency%	۷. Daily feeding rate%	

جدول ۱. تغییرات داده‌های مربوط به پارامترهای بررسی شده در تیمارهای مختلف در ۲۰ روز اول و دوم پرورش، بعد از قطع غذایی با تیمارهای ذکر شده و تغذیه با غذای تجارتي كنسانتره. داده‌ها با حروف متفاوت در سطح $\alpha=0.05$ دارای اختلاف معنی‌دار هستند ($p<0.05$).

فرموله شده	ناپلی + فرموله شده	سیست + فرموله شده	ناپلی آرمیا	سیست کپسول‌زدایی شده	
وزن نهایی ۲۰ روز اول	0.473 ± 0.075^c	0.576 ± 0.01^b	0.572 ± 0.01^b	0.674 ± 0.02^a	0.595 ± 0.05^b
وزن نهایی ۲۰ روز دوم	1.6 ± 0.075^a	1.6 ± 0.01^ab	2.1 ± 0.01^c	1.9 ± 0.02^bc	1.8 ± 0.05^{abc}
فاکتور وضعیت	1.05 ± 0.03^a	1.08 ± 0.06^a	1.22 ± 0.06^b	1.12 ± 0.02^{ab}	1.13 ± 0.02^{ab}
Growth rate%	$1.03/2 \pm 1/9^a$	$1.42/9 \pm 9/4^b$	$1.79/6 \pm 6/7^c$	$1.55/4 \pm 16/5^{bc}$	$1.51/4 \pm 19/5^{bc}$
SGR	$3/39 \pm 0.04^a$	$4/2 \pm 0.1^b$	$4/8 \pm 0.1^c$	$4/4 \pm 0.3^{bc}$	$4/38 \pm 0.3^{bc}$
Survival	$99/4^a$	$99/7 \pm 4^a$	$99/6 \pm 9^a$	$99/7 \pm 9^a$	$98/6 \pm 1/9^a$
Daily feed intake (g/fish)	0.59 ± 0.009^a	0.62 ± 0.01^a	0.67 ± 0.02^b	0.67 ± 0.019^b	0.61 ± 0.009^a
Daily feeding rate %	$4/9 \pm 0.03^{ab}$	$5/2 \pm 0.07^b$	$4/6 \pm 0.13^a$	$4/9 \pm 0.3^{ab}$	$4/7 \pm 0.18^c$
FCR	$1/4 \pm 0.0008^b$	$1/11 \pm 0.15^a$	$1/0.7 \pm 0.14^a$	$1/16 \pm 0.14^a$	$1/12 \pm 0.07^a$
Feeding efficiency %	$67/4 \pm 0.04^a$	$90/7 \pm 12/5^a$	$93/6 \pm 12/4^a$	$86/4 \pm 11^a$	$89/1 \pm 6/2^a$


وزن نهایی لاروها در ۲۰ روزه اول در تیمار ناپلی آرمیا برابر ۶۷۴ میلی‌گرم بود که دارای اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها بود. در حالی‌که بالاترین مقدار وزن نهایی در ۲۰ روز دوم در تیمار سوم (سیست کپسول‌زدایی شده + غذای فرموله شده) مشاهده شد که برابر ۲/۱ گرم بود اگر چه اختلاف معنی‌دار با تیمارهای اول و دوم نداشت.

در مورد فاکتور وضعیت لاروهای تیمارهای اول، دوم و سوم نسبت به تیمارهای چهارم و پنجم وضعیت بهتری داشتند و اختلافات معنی‌دار بود و لاروهای تیمار سوم فاکتور وضعیت بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (جدول ۱).

داده‌های به دست آمده پارامترهای درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه تیمارهای اول و دوم و سوم نسبت به سایر تیمارها بالاتر و معنی‌دار بودند ($p < 0.05$).

ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای اول تا چهارم با تیمار پنجم دارای اختلاف معنی‌دار بود. در مورد فاکتورهای بقا و کارایی غذایی در تیمارهای بررسی شده اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (جدول ۱). شکل ۱ وزن

نهایی در تیمارهای بررسی شده را نشان می‌دهد. در این شکل وضعیت رشد لاروها در ۲۰ روزه دوم تغذیه با غذای فرموله شده مشاهده می‌شود.



شکل ۱. آهنگ رشد لاروها در تیمارهای مختلف در بیست روزه دوم پرورش. لاروهایی که در مرحله اولیه تغذیه با مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده تجاری تغذیه شده‌اند دارای آهنگ رشد سریع‌تر هستند (لازم به ذکر است که منحنی ۱ سیستم کپسول‌زدایی شده، ۲ ناپلی، ۳ سیستم و ناپلی، ۴ ناپلی و سیستم، ۵ غذای فرموله شده است)

بحث

اهمیت استفاده از ناپلی‌های تازه به عنوان غذای آغازی برای اغلب ماهیان دریایی و آب شیرین ثابت شده است [۹]، [۱۱]. سیستم و ناپلی آرتمیا از اهمیت غذایی خاص برخوردارند؛ زیرا ناپلی آرتمیا به عنوان منبع خارجی آزمایشی، فعالیت پروتئولیتیکی در داخل دستگاه گوارش لاروها دارد [۶]، [۸]. هر کدام از این محصولات دارای مزایایی هستند. ناپلی آرتمیا دارای پروتئین بیشتری نسبت به سیستم کپسول‌زدایی شده است در عین حال سیستم کپسول‌زدایی شده دارای مقدار انرژی و چربی بیشتری نسبت به ناپلی آرتمیا است. همچنین با توجه به اندازه سیستم کپسول‌زدایی شده (۲۰۰ میکرون) اندازه آن مناسب اغلب لاروهای ماهیان است. سیستم کپسول‌زدایی شده، امکانات کمتری برای عمل‌آوری نسبت به ناپلی‌های تازه به نیاز دارد [۱۳].

لارو ماهیانی که با محصولات متفاوت آرتمیا (سیستم کپسول‌زدایی شده و ناپلی آرتمیا) تغذیه می‌شوند معمولاً دارای رشد افزون‌تری نسبت به سایر لاروها هستند [۴]. با توجه به این دلایل، در مورد مزایای ناپلی آرتمیا رشد معنی‌دار لاروها در این تیمار در ۲۰ روز اول قابل پیش‌بینی بود؛ چنان‌که در مورد لارو ماهیان دیگر این نتیجه به دست آمده است [۱]، [۲]، [۳]، [۴]. ولی مسئله اصلی این است که نمی‌توان برای تمام مراحل رشد از ناپلی آرتمیا و محصولات آن استفاده کرد. هزینه و امکانات زیاد از جمله عوامل اصلی محدود کننده به شمار می‌رود. این مسئله که لاروهای حاصل از تغذیه با ناپلی و سیستم کپسول‌زدایی شده دارای آهنگ رشد سریع‌تری

هستند ثابت شده است [۱]، [۲]، [۳]، [۴]. ولی آیا بعد از قطع غذای زنده این لاروها آهنگ رشد خود را حفظ خواهند کرد؟ لاروهای بررسی شده در این پژوهش به مدت ۲۰ روز با ۵ تیمار غذایی آرتمیا تغذیه شدند و بعد از ۲۰ روز، تغذیه با این تیمارها قطع شد و تغذیه با غذای فرموله شده شروع شد. در پایان ۲۰ روز اول طبق پیش بینی‌های اولیه و نتایج تحقیقات اخیر، لاروهایی که با ناپلی آرتمیا تغذیه شده بودند دارای رشد بیش‌تری بودند، ولی وقتی لاروها در ۲۰ روز دوم فقط با غذای فرموله شده تغذیه شدند آهنگ رشد تغییر کرد و لاروهایی دارای بیش‌ترین رشد بودند که در ۲۰ روز اول، با مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده تغذیه شده بودند؛ اگرچه اختلاف آن‌ها با لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیا معنی‌دار نبود. در اکثر پارامترهای بررسی شده در جدول ۱، لاروهای تغذیه شده با مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده در ۲۰ روزه اول دارای بالاترین وزن، فاکتور وضعیت و SGR بودند. همچنین FCR غذایی در این تیمار نسبت به سایر تیمارها کمتر بود، اگرچه اختلاف معنی‌دار با تیمارهای دیگر نداشت و تنها تیمار پنجم که غذای فرموله شده بود دارای اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها بود و دارای بالاترین ضریب تبدیل غذایی بود.

مسئله افزایش وزن لاروهای تیمار مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده در بیست روزه دوم پرورش و آهنگ سریع رشد نسبت به سایر تیمارها، از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول که مهم‌تر به نظر می‌رسد بحث عادت غذایی در این لاروهاست. لاروهایی که با مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده تغذیه شده‌اند، در شروع تغذیه به غذای ساکن و بدون تحرک عادت کرده‌اند. این مسئله باعث می‌شود در مراحل بعدی (شروع تغذیه با غذای کنسانتره در ۲۰ روزه دوم) مشکلی از بابت عادت به تغذیه با غذای جدید نداشته باشند. لاروهای تاسماهی ایران (*Acipenser persicus*) که در مراحل اولیه با تیمارهای مختلف آرتمیا تغذیه شده بودند در مراحل بعدی رشد بررسی شدند که نتایج به دست آمده نشان داد تیمارهایی که با مخلوط غذای فرموله شده و ناپلی آرتمیا پرورش داده شده بودند در مراحل بعدی به علت عادت به تغذیه دستی در همان مراحل اولیه دارای رشد و بازماندگی خوب نسبت به سایر تیمارها بودند [۱]. نتایج به دست آمده در مورد طرح مشابهی که در لارو ماهی آزاد دریای خزر (*Salmo trutta caspius*) انجام شد، مشابه نتایج این تحقیق بود [۳]. ولی جنبه دوم بحث تأثیرات تغذیه‌ای مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده است. سیستم کپسول‌زدایی شده از لحاظ انرژی و چربی نسبت به ناپلی آرتمیا در رتبه بالاتری قرار دارد. استفاده از مخلوط سیستم کپسول‌زدایی شده و غذای فرموله شده باعث می‌شود که لاروهای این تیمار به لحاظ داشتن محتوای انرژی زیاد در مراحل بعدی رشد نسبت به سایر تیمارها در وضعیت بهتری باشند. همچنین لاروهای تاسماهی ایران (*Acipenser persicus*) که در مراحل اولیه با تیمارهای مختلف آرتمیا تغذیه شده بودند در مراحل بعدی رشد بررسی شدند که نتایج به دست آمده نشان داد که لاروهای که با مخلوط غذای فرموله شده و ناپلی آرتمیا

پرورش داده شده بودند در مراحل بعدی به علت عادت به تغذیه دستی دارای رشد خوب بودند [۱]. نتایج به دست آمده در مورد طرح مشابهی که در لارو ماهی آزاد دریای خزر (*Salmo trutta caspius*) انجام شد مشابه نتایج این تحقیق بود [۳]. با توجه به نتایج به دست آمده در این طرح و طرح‌های مشابه پیشنهاد می‌شود که در مراحل اولیه رشد لاروهای قزل آلا اگر به استفاده از محصولات آرتمیا نیاز است می‌توان از سیستم‌هایی با درصد هچ اندک و ارزان مخلوط با غذای فرموله شده تجاری استفاده کرد. با توجه به انرژی زیاد سیستم و قیمت ارزان آن (سیستم‌هایی با درصد هچ اندک) این مسئله مقرون به صرفه است.

تشکر و قدردانی

در پایان بر خود لازم می‌دانم که از زحمات کارکنان پژوهشگاه آرتمیا و جانوران آبی، دانشگاه ارومیه تشکر و قدردانی کنم.

منابع

۱. آق، ن. بررسی روش بهینه برای آدپتاسیون لاروهای تاسماهی ایرانی (*Acipenser persicus*) با غذای کنسانتره تجاری. طرح پژوهشی پژوهشگاه آرتمیا و جانوران آبی دانشگاه ارومیه (۱۳۸۴).
۲. سلیمی، ب. و مشکینی، س. تأثیر تیمارهای مختلف غذایی آرتمیا در رشد و بقا لارو نورس قزل آلا رنگین کمان. پایان‌نامه دکترای دامپزشکی. دانشگاه ارومیه (۱۳۸۳).
۳. جواهری، م. تأثیر غنی سازی آرتمیا با اسیدهای چرب غیر اشباع بر رشد و بقا لارو ماهی آزاد دریای خزر (*Salmo trutta caspius*). طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه آرتمیا، دانشگاه ارومیه (۱۳۸۵).
۴. محمد زاده س. و کامرانی الف. و آق ن. تأثیر ناپلی آرتمیای غنی شده در رشد، بقا و مقاومت لاروهای قزل آلا رنگین کمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هرمزگان (۱۳۸۲).
5. Callan, C.; jordan, A.; king L. J. Reducing *Artemia* use in the culture of Atlantic cod (*Gadus morhua*) Aquaculture. Vol. 219. (2003) 585-595.
6. Dabrowski, D. The role of proteolytic enzymes in fish digestion- a new approach. Special publication of the European Mariculture society 4 (1979) 41-46.
7. Ergun M. Growth and Feed Consumption of Young Rainbow Trout (*oncorhynchus mykiss*) Exposed to Different Photoperiods. The Israel Journal of Aquaculture 55 (2003) 132-138.
8. Lauff, M. and R. Hoffer. Proteolitic enzymes in fish development and the importance of dietary enzymes. Aquaculture 37 (1984) 335-346.

9. Leger, P., D. A. Bengtson, K. L. Simpson and P. Sorgeloos. The use and nutrition value of *Artemia* as a food source. *Oceanography and Marine biology: An Annual Review* 24 (1986) 521-623.
10. Leitritz, E. Trout and Salmon Culture. State of California, Department of Fish and Game, Sacramento (1976).
11. Sorgeloos, P., P. Leger and P. Lavens. Improved larval rearing of European and Asia sea bass, sea bream, mahi-mahi, siganid and milkfish using enrichment diet for *Brachinus* and *Artemia*. *World Aquaculture* 19(4) (1988) 78-79.
12. Person-Le ruyet. Le elavage do turbot En Europe La pisciculture francaise. 112 (1993) 5-22.
13. Verreth, J., V. Stoch and H. Segner. A comparative study on the nutritional quality of decapsulated *Artemia* cysts microencapsulated egg diets and enriched dry feeds for *clarias graiepinus* larvae. *Aquaculture* 63 (1987) 269-282.